DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

BAREM VARIANTA 1

pentru subiectele pentru concursul de promovare a personalului contractual debutant sanitar din cadrul Serviciului de Asistență Socială, Compartiment Îngrijiri Comunitare

Varianta I

1. **Reguli generale de administrare a medicamentelor – 50 puncte**

- **asistenta**
- respectă medicamentul prescris de medic – **2 pct**
- identifică medicamentul prescris după etichetă, forma de prezentare, culoare, miros, consistență – **3 pct**
- verifică calitatea medicamentelor, observând integritatea, culoarea medicamentelor solide; sedimentarea, tulburarea, opalescența medicamentelor sub formă de soluție – **5 pct**
- respectă căile de administrare prescrise de medic – **2 pct**
- respectă orarul și ritmul de administrare a medicamentelor pentru a se menține concentrația constantă în sânge, având în vedere timpul și căile de eliminare a medicamentelor – **4 pct**
- respectă doza de medicament- doza unică și doza/24h – **3 pct**
- respectă somnul fiziologic al pacientului – organizează administrarea în afara orelor de somn (se trezește pacientul în cazul administrării antibioticelor, chimioterapicelor cu ore fixe de administrare) – **4 pct**
- evită incompatibilitățile medicamentoase datorate asocierilor unor soluții medicamentoase în aceiași seringă, în același pahar – **2 pct**
- servește pacientul cu doza unică de medicament pentru administrarea pe cale orala – **3 pct**
- respecta urmatoarea succesiune in administrarea medicamentelor: pe cale orala – solide, lichide, apoi injectii, dupa care administrează ovule vaginale, supozitoare – **8 pct**
- informează pacientul asupra medicamentelor prescrise în ceea ce privește efectul urmărit și efectele secundare – **2 pct**
- anunță imediat medicul privind greșelile produse în administrarea medicamentelor legate de doză, calea și tehnica de administrare – **8 pct**
- administrează imediat soluțiile injectabile aspirate din fiole, flacoane – **2 pct**
- respectă măsurile de asepsie, de igienă, pentru a preveni infecțiile intraspitalicești – **2 pct**

2. **Colica biliară – simptomatologie și conduită de urgență la domiciliu – 50 pct**

Simptomatologie: 30 pct

- Durerea se datorește unor contracții spastice reflexe ale veziculei sau ale căilor biliare, urmate de creșteri ale presiunii din arborele biliar.
- debutează în hipocondrul drept sau în epigastru, se accentuează progresiv, atingând intensitatea maximă în câteva ore și cedează brusc sau lent.
- iradiază sub rebordul costal drept în regiunea dorso-lombară, scapulară, în umărul drept.
- Grețuri, vărsături cu conținut alimentar sau bilios.
- Icter. Colorația se datorește unii edem, spasm, reflex al sfincterului Oddi și se poate instala fără să existe un obstacol prin calcul pe coledoc.
- Frisonul apare când predomină infecția căilor biliare, este urmat de transpirații abundente și stare generală rea.
- Febra apare mai ales în colecistitele acute și anglocolite secundare infecției cu germeni microbieni
- Semne locale – Vezicula biliară poate fi palpabilă și foarte sensibilă, ceea ce se pune în evidență cerând bolnavului să inspire profund în timp ce mâna palpează hipocondrul drept. Dacă vezicula este inflamată, în inspirație profundă, când ea atinge mâna celui ce palpează, bolnavul simte o durere accentuată (semnul Murphy – prezent)

Conduita de urgență – 20 pct

- Colicile biliare de intensitate și durată mică, fără complicații, pot fi tratate la domiciliu prin:
- repaus la pat
- regim alimentar
- analgetice
- antispastice(lizadon, scobutil, foladon tablete)
- Colicile biliare însoțite de vărsături (cu tulburări hidroelectrolitice), la cel mai mic semn de evoluție nefavorabilă necesită internarea de urgență pentru investigații și tratament medico – chirurgical.

Secretar comisie de concurs: Grigore Ioana Daniela, inspector, Birou Resurse Umane, Juridic, Sanatate si Securitatea Muncii.....